

## **Metysergid (Methysergide\*) Sansert® / Deseril®**

---

*Alkaloid sporyszu, Antimigraenicum, Antiserotoninicum* ATC: N 02 CA

[8β(S)]-9,10-Didehydro-N-[1-(hydroksymetylo)-propylo]-1,6-dimetyloergolino-8-karboksamid Amid kwasu N-[1-(hydroksymetylo)-propylo]-1-metylo-D-lizergowego CAS: 361-37-5

**Pochodne** : *Maleinian metysergidu* ;CAS: 129-49-7

---

**Działanie.** Lek o silnym kompetycyjnym działaniu antagonistycznym na receptory serotonergiczne. Wykazuje też słabe właściwości zwężające naczynia i pobudzające skurcze macicy. Podany doustnie wchłania się szybko i dobrze; w organizmie ulega częściowemu zmetabolizowaniu. Wydalanie z osocza przebiega dwufazowo: okres półtrwania fazy szybkiej wynosi 2,7 h, fazy wolnej - 10 h. Jest wydalany gł. z moczem (56%) - w stanie nie zmienionym i w postaci metabolitów. Po 1-2 dniach stosowania w 3 dawkach dz. osiąga w surowicy stan ustalony.

---

**Wskazania.** Metysergid jest stosowany w zapobieganiu nawrotom ciężkiej migreny, bólom głowy pochodzenia naczyniowego, np. w zespole Hortona, w leczeniu zespołu rakowiaka oraz w zespole poposiłkowym po resekcji żołądka.

---

**Interakcje.** Metysergid może nasilać działanie leków zwężających naczynia krwionośne.

---

**Przeciwwskazania/Ostrzeżenia specjalne.** Posocznica, zaburzenia krążenia obwodowego (zwł. tętniczego), zapalenie żył, niewydolność wieńcowa, ciężkie nadciśnienie, upośledzenie czynności wątroby i nerek, wyniszczenie, choroby płuc, choroby dróg moczowych, kolagenozy, ciężka miażdżycza naczyń. *Ciąża (kat. X), Karmienie piersią, Dzieci.* Nie należy stosować.

---

**Działania niepożądane.** Może spowodować nudności, zawroty głowy, oszołomienie, zaburzenia snu i koncentracji, zaburzenia czucia, bóle mięśniowe i stawowe, omamy, obrzęki, wysypki skórne, zaburzenia ukrwienia obwodowego, skurcze dużych naczyń. Rzadziej obserwuje się zmiany włókniste opłucnowo-płucne z objawami bólu serca i klatki piersiowej oraz dusznością; w tych przypadkach należy przerwać podawanie leku. Po dłuższym podawaniu może wystąpić włóknienie zaotrzewnowe, powodujące zwężenie dróg moczowych i wielkich naczyń. W razie wystąpienia zaburzeń ukrwienia obwodowego leczenie należy przerwać.

---

**Dawkowanie.** Doustnie początkowo 1-2 mg po wieczornym posiłku, po kilku dniach podaje się następne 2 mg rano po posiłku. W razie potrzeby dawki zwiększa się do 2 mg 3 razy dz. Preparaty retard podaje się początkowo w dawce 0,75-1,5 mg po śniadaniu i kolacji, po kilku dniach dawkę się zwiększa do 3 mg 2 razy, maksym. 3 razy na dobę. Po kilku tyg. należy spróbować zmniejszyć dawkę do podtrzymującej. Czas trwania kuracji nie powinien przekraczać 6 mies.; po miesięcznej przerwie leczenie można powtarzać. Leczenia nie należy nagle przerywać, lecz stopniowo zmniejszać dawki w ciągu 2-3 tygodni. W zespole rakowiaka 12-20 mg na 24 h.

---

---

**Preparaty proste :**

- **Sansert®** (Novartis, CDN, USA): tabl. powł. 2 mg (maleinian).
- **Deseril®** (Novartis, F / Belgia ): tabl. 1mg

**Rozpoznanie, diagnozy i dobór leków należą tylko i wyłącznie do lekarzy!!!**

**Eksperymenty z lekami na własną rękę zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta!!!**