

Osobe za kontakt sa CSG-grupom:

Präsident:

Dr. Harald Müller, 41539 Dormagen
Tel. 00492133478-484

harald.mueller@clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de

Generalsekretär:

Jakob C. Terhaag, 52525 Waldfeucht
Tel. 004924559309954

jakob.c.terhaag@clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de

Vizepräsident:

Hans-Josef Liebertz, 50321 Brühl
Tel. 00492232931550

h.josef.liebertz@clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de

Schatzmeisterin:

Anja Alsleben, 48599 Gronau
Tel. 00492562965-255

anja.alsleben@clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de

Prosljedjivanje i umnozavalje u svrhu besplatnog sirenja informacija je pozeljno.

U tu svrhu zatrazite na dolje navedenoj adresi jednu disketu ili preuzmite potrebne podatke sa dolje navedene Homepage-adrese.

Promjena sadrzaja ili unosjenje novih podataka nije dozvoljeno.

Copyright 2002

CSG e.V.
Talstr. 53
52525 Waldfeucht


Tel. 0049 2455 / 9309954

www.clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de

www.clusterkopfschmerz.de

www.clusterkopf.de

Jakob.C.Terhaag@clusterkopfschmerz-selbsthilfe.de




Cluster-glavobolja Sta je to?

CSG

Grupa za
Samopomoc
Protiv
Cluster-glavobolje

Deutschland



Sta je Cluster-glavobolja?

Jako bolna Cluster-glavobolja naziva se jos i Bing-Horton-glavobolja, a u skoro svim slucajevima nastupa jednostrano i konstantno uvijek na istoj strani glave.U glavnom dolazi samo par tjedana u godini do tih bolnih napadaja. Prema toku bolova razlikuju se razliciti oblici bolesti.

Ime Cluster dolazi iz engleskog i znaci pramen. To znači, da napadaji česce nastupaju uvjek u određeno vrijeme na pr. u proljeće ili jesen. Novija istraživanja se sa tim ne slazu.

Izrazito jake glavobolje nastupaju u obliku napadaja i gotovo uvijek jednostrano u području oka ili sljepoočice.Duljina tih napadaja, koji se pojavljuju bez nekih predznakova i uglavnom nocu oko 90 minuta nakon pocetka sna, traju između 15 minuta i 3 sata.Neki bolesnici se bude sa tim bolovima ili imaju danju te bolove.Broj napadaja se kreće između 1 do 8 na dan ili noc.

Kod dolaska napadaja pocinje u pravilu na toj strani glave curiti nos, a oko se zacrveni i pocne suziti .Suprotno bolesniku migrene, koji se povuce u zamracenu, mirnu rostoriјu, bolesnik Cluster-glavobolje postaje jako nemiran. Pocinje se setati, pritisne rukama sljepoočice, trazi hladnoci i u izuzetnim slucajevima pocne vikati ili udarati glavom u zid.

Kod oko 80% Cluster-bolesnika nastupaju ti napadaji povremeno za vrijeme par tjedana ili par mjeseci u godini.Tada se govori o povremenim Cluster-glavoboljama.Za vrijeme Cluster-razdoblja napadaji bolova budu izazvani t. zv. Trigger-om.(izazivac).

Cluster-razdoblje može trajati par dana, ali i do par mjeseci.Na to se nadovezuju dani, mjeseci ili cak godine u kojima bolesnik zivi bez ikakvih bolova.

Uzroci Cluster-glavobolje

Pravi razlog Cluster-glavobolje je uvijek još nepoznat.

Postoje najmanje dvije teorije, kojima se pokuša objasniti nastajanje Cluster-glavobolje.

Cluster-glavobolje su bolovi zila u glavi

Ta teorija stoji na stanovistu, da materije koje prosliraju zile, mogu izazvati Cluster-glavobolju.Kod toga dolazi do bolovi zbog upale vena u oku i Sinus cavernosus (upala nije izazvana bakterijama).Promjene na tim venama mogu se graficki objasniti.

Zbog upale, otecene vene zatvore put dovodu krvi i pritisnu arteriju-carotis (aorta) na zid kanala kroz koji ona prolazi u lubanju. Podrazaj zivca simpatikus izazove tipične popratne pojave, kao na pr. suze, crvenilo ociju i zatvoren nos.

Kriv je Hypothalamus

Druga teorija tumaci, da kod osoba sa Cluster-glavoboljom dolazi u povećanoj mjeri do stvaranja mozdane tvari u području hypothalamus-a, koji je dio malog mozga.

Kako mali mozarak između ostalog kontrolira ritam spavanja i budnosti, kao i ostale bioloske procese, moglo bi se njegovim sudjelovanjem objasniti to vremensko pojavljivanje Cluster-glavobolja i taj ritam: proljeće ili jesen. Procesne slike (rentgen, EEG i t. d.) bolesnika sa Cluster-glavoboljom pokazuju za vrijeme napadaja rad zivčanih stanica, koje nisu poznate kod drugih vrsta glavobolja.

Za bolesnika je vazno pronaci liječnika, koji je upoznat tim problemom. To nije uvijek jednostavno, ali se isplati. Trazite tako dugo, dok ne nadjete „pravog“ liječnika.

Druga vazna mogućnost, sukobiti se sa Cluster-glavoboljom i njezinim posljedicama, je pristupanje jednoj grupi za samopomoć.

Momentalno se u Njemackoj organiziraju samostalne grupe za samopomoć kod Cluster-glavobolje. Zbor razlikovanja od nekih drugih grupa i zbog složnosti upotrebljavaju kraticu

CSG (Cluster-Selbsthilfe-Gruppe ili Cluster-Grupa-za-Samopomoć)

Ukoliko ste pogodjeni tom bolescu javite se i sudjelujte u nasem radu.Time možete pomoci sebi i drugima.Na prvoj strani ove informacije naci cete adrese osoba za uspostavljanje kontakta.

Ukoliko se ne želite ili ne možete aktivno ukljuciti u rad grupe, bez obzira da li ste bolesnik ili ne, možete svejedno pomoci novčanim doprinosom ili nam možete nekoga preporučiti tko

može novčano potpomagati rad grupe. Ovdje ima još mjesta za adresu osobe, koja može i zeli pomoci.